

Le premier biosimilaire de Rituxan® (rituximab) offert au Canada^{1,2*}

Pr Truxima^{MD}
Rituximab pour injection
Solution à 10 mg/mL
pour perfusion intraveineuse

**Biosimilaire de conception.
Biologique par essence.**

Lymphome non hodgkinien (LNH)^{2†‡}

PrTRUXIMA^{MD} (rituximab pour injection) est indiqué dans le traitement des patients atteints d'un lymphome non hodgkinien de type B, CD20 positif, folliculaire, de stade III/IV non traité auparavant, en association avec un protocole de chimiothérapie CVP (cyclophosphamide, vincristine et prednisolone).



Polyarthrite rhumatoïde^{2‡}

TRUXIMA^{MD}, en association avec le méthotrexate, est indiqué pour soulager les signes et les symptômes de la PR évolutive modérée ou grave chez les adultes ayant montré une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs traitements par des inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (anti-TNF).

Leucémie lymphoïde chronique (LLC)^{2‡}

TRUXIMA^{MD} (rituximab pour injection) est indiqué dans le traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique à cellules B (LLC-B) de stade B ou C de Binet, ayant été traités auparavant ou n'ayant jamais été traités, en association avec la fludarabine et le cyclophosphamide.



Vasculite à ANCA^{2,3‡}

TRUXIMA^{MD}, en association avec des glucocorticoïdes, est indiqué chez les adultes comme traitement d'induction de la rémission de la granulomatose avec polyangéite (GPA, aussi connue sous le nom de granulomatose de Wegener) et de la polyangéite microscopique (PAM) actives et graves.



**TRUXIMA^{MD} : fièrement offert
par Teva Canada Innovation.**

**TRUXIMA^{MD} est offert depuis
2017 en UE^{4*}.**



* La portée clinique comparative est inconnue.

† Veuillez consulter la monographie de TRUXIMA^{MD} pour obtenir la liste complète des indications dans le traitement du LNH.

‡ Les indications ont été accordées sur la base de la similarité entre TRUXIMA^{MD} et le médicament biologique de référence Rituxan®.

ANCA : anticorps anticytoplasme des neutrophiles; TNF : facteur de nécrose tumorale; UE : Union européenne.

DIN	02478382, 02478390
CUP	068510998873, 068510998880
Numéro d'article	TRUXIMA ^{MD} à 100 mg/10 mL par perfusion i.v. : 85006-0002 TRUXIMA ^{MD} à 500 mg/50 mL par perfusion i.v. : 85007-0001
Catégorie de médicament	Antinéoplasique ²
Forme posologique	TRUXIMA ^{MD} est un concentré liquide stérile, transparent, incolore et sans agent de conservation pour l'administration par voie intraveineuse ²
Teneurs	10 mg/mL [fioles à usage unique de 100 mg (10 mL) ou de 500 mg (50 mL)] ²
Voie d'administration	Perfusion intraveineuse ²
Ingrédients non médicinaux	Chlorure de sodium, citrate trisodique dihydraté, polysorbate 80 et eau pour injection ²
Conditionnement	Fioles à usage unique de 100 mg et de 500 mg 100 mg : chaque boîte contient deux fioles à 100 mg/10 mL (10 mg/mL) 500 mg : chaque boîte contient une fiole à 500 mg/50 mL (10 mg/mL) ²
Directives de conservation	Les fioles de TRUXIMA ^{MD} sont stables entre 2 °C et 8 °C. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur la boîte. Laisser les fioles dans leur boîte pour les protéger de la lumière ² .

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre gestionnaire de comptes hospitaliers de Teva Canada au 1-800-268-4129.

Pour de plus amples renseignements :

Veuillez consulter la monographie du produit à l'adresse tevacanada.com/globalassets/canada-scs-files---global/product-monographs/truxima-product-monograph_fr.pdf pour obtenir des renseignements importants sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie, l'administration (par perfusion i.v. dans une tubulure réservée à ce médicament, et non par voie intraveineuse rapide ni sous forme de bolus intraveineux) et les conditions d'usage clinique qui n'ont pas été abordés dans le présent document. Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en communiquant avec Teva Canada Innovation, au 1-833-662-5644.

Références : 1. Données internes. *First to market rituximab biosimilar*. Teva Canada. 21 mai 2019. 2. Monographie de TRUXIMA^{MD}. Teva Canada Limitée. 22 août 2024. 3. Jennette JC, et al. 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. *Arthritis Rheum*. 2013;65(1):1-11. 4. Biotec Services International Ltd. Résumé des caractéristiques du produit pour TRUXIMA^{MD}. Disponible au https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/truxima-epar-product-information_fr.pdf. Consulté le 12 mars 2025.

Rituxan® est une marque déposée d'IDEC Pharmaceuticals Corporation, utilisée sous licence.

P^TTRUXIMA^{MD} est une marque déposée de Celltrion Inc.

© 2025 Teva Canada Innovation G.P. - S.E.N.C. Montréal (Québec) H2Z 1S8

04/2026
TRUX-CA-00152F

Pr Truxima^{MD}
Rituximab pour injection
Solution à 10 mg/mL
pour perfusion intraveineuse

